

# Imię i nazwisko

## Błotniaki

Błotniaki, to liczący 13 gatunków rodzaj ptaków drapieżnych z rodziny jastrzębiowatych (*Accipitridae*), rzędu sokołowych (*Falconiformes*), występujących w Eurazji, Afryce i Ameryce. Ptaki te osiągają długość ciała do 55 cm i rozpiętość skrzydeł do 130 cm. U błotniaków obserwuje się dymorfizm płciowy w ubarwieniu: samce są popielate, a samice rdzawe. Samice są większe od samców. Ptaki te stosunkowo słabo latają. Polują (chodząc) na płazy i gryzonie. Do europejskich błotniaków należą: błotniak łąkowy (*Circus pygargus*), błotniak zbożowy (*Circus cyaneus*), błotniak stawowy (*Circus aeruginosus*) i błotniak stepowy (*Circus macrourus*). W Polsce wszystkie gatunki błotniaków objęte są ochroną.

<b>Błotniak łąkowy - <i>Circus pygargus</i> .....</b>	<b>2</b>
Wiadomości ogólne .....	2
Gniazdowanie .....	2
W Polsce .....	2
<b>Błotniak zbożowy - <i>Circus cyaneus</i> .....</b>	<b>3</b>
Wiadomości ogólne .....	3
Gniazdowanie .....	3
W Polsce .....	3
<b>Błotniak stawowy - <i>Circus aeruginosus</i> .....</b>	<b>4</b>
Wiadomości ogólne .....	4
Gniazdowanie .....	4
W Polsce .....	4
<b>Błotniak stepowy - <i>Circus macrourus</i> .....</b>	<b>5</b>
Wiadomości ogólne .....	5

## **Błotniak łąkowy - *Circus pygargus***

Błotniak łąkowy, ptak z rodziny jastrzębiowatych (*Accipitridae*), rzędu ptaków drapieżnych (*Falconiformes*), występuje w Europie, Azji i północnej Afryce. Zamieszkuje rozległe łąki lub bagna z wysoką trawą i kępami krzaków. Zimuje w południowej Afryce.

### **Wiadomości ogólne**

Błotniaki łąkowe osiągają długość ciała ok. 43 cm, rozpiętość skrzydeł ok. 105 cm i wagę 227-440 g. Są nieco mniejsze i smuklejsze od błotniaków zbożowych. Samiec ma upierzenie popielate z ciemnymi paskami na skrzydłach. Ptaki te (jak wszystkie błotniaki) latają nisko nad ziemią hybotliwym lotem ze skrzydłami uniesionymi w kształcie litery v. Błotniak łąkowy żywi się drobnymi kręgowcami łąkowymi (głównie gryzoniami), dużymi owadami oraz jajami i pisklętami innych ptaków. Ptaki te odzywają się przede wszystkim w czasie toków i podczas wysiadywania jaj.

### **Gniazdowanie**

Błotniaki łąkowe gnieźdzą się na torfowiskach i bagnach, ale coraz częściej zakładają gniazda w zbożach i w rzepaku. W maju-czerwcu, na ziemi, pod osłoną roślinności samica składa 4-5 jaj, które sama wysiadyje przez 28-29 dni. Pisklęta są gniazdownikami. Błotniaki łąkowe wyprowadzają 1 lęg w roku.

### **W Polsce**

Błotniak łąkowy w Polsce jest nielicznym ptakiem lęgowym. W północnej i wschodniej części kraju gnieździ się 300-500 par. Gniazda tych błotniaków można też niekiedy spotkać na polach rzepaku w okolicach Wrocławia i Opola. Błotniaka łąkowego można też obserwować podczas przelotów: wiosenny - kwiecień-maj, jesienny - sierpień-wrzesień. Gatunek ten jest zanikający na skutek osuszania bagien.

## **Błotniak zbożowy - *Circus cyaneus***

Błotniak zbożowy, ptak z rodziny jastrzębiowatych (*Accipitridae*), rzędu sokołowych (*Falconiformes*), występuje w całej Europie, środkowej Azji, aż do Oceanu Spokojnego oraz w Ameryce Północnej. Zamieszkuje gęste zarośla na nieuczęszczanych miedzach w pobliżu starorzeczy lub dużych kompleksów łąk i stawów oraz wyspy na rzekach z niewielkimi skupiskami krzewów i wysoką roślinnością zielną. Zimuje w południowej Europie, północnej Afryce, południowej Azji oraz Ameryce Środkowej i Południowej.

### **Wiadomości ogólne**

Błotniak ten osiąga 48 cm długości ciała, 110 cm rozpiętości skrzydeł i 300-700 g wagi. Samica jest nieco większa od samca. W ubarwieniu występuje wyraźny dymorfizm płciowy. Samiec jest jasnopopielaty z białym brzuchem i czarnymi lotkami. Ma czarny dziób i żółte nogi. Samica ma wierzch ciała brązowy, a spód rdzawożółty z ciemnymi plamami, kuper - biały. Błotniak zbożowy ma smukłą sylwetkę, długie i wąskie skrzydła oraz długi ogon. odżywia się dużymi owadami i małymi kręgowcami.

### **Gniazdowanie**

Gnieździ się na ziemi, na bagnach i torfowiskach, w szuwarach, trawach i turzycach. W maju-czerwcu samica znosi 4-6 jaj i wysiaduje je przez ok. 30 dni. Pisklęta są gniazdownikami. Błotniaki te wyprowadzają 1 lęg w roku.

### **W Polsce**

W Polsce błotniaki zbożowe są nieliczne lęgowo. Gnieździ się u nas ok. 70 par tego gatunku. Główną ostoją lęgową tych ptaków są Bagna biebrzańskie oraz okolice Zalewu Szczecińskiego. Notuje się ciągły spadek liczebności tych błotniaków na naszych ziemiach. Błotniaki zbożowe można obserwować w czasie przelotów wiosennych (marzec-kwiecień) oraz jesiennych (wrzesień-listopad).

## **Błotniak stawowy - *Circus aeruginosus***

Błotniak stawowy - ptak z rodziny jastrzębiowatych (*Accipitridae*), rzędu ptaków drapieżnych (*Falconiformes*), występuje w Europie, Azji i Afryce. Zamieszkuje zarosnięte stawy i jeziora. Zimuje w południowej Europie i Afryce.

### **Wiadomości ogólne**

Błotniak ten osiąga długość ciała 55 cm, rozpiętość skrzydeł 130 cm i wagę 400-800 g. Jest to smukły ptak o brązowym upierzeniu. Pokarmem jego są jaja i pisklęta ptaków, drobne gryzonie (np. piżmaki), a także martwe węże i ryby. Pokarmu błotniak stawowy poszukuje na bagnach, łąkach i polach (unika lasów).

### **Gniazdowanie**

Gniazdo, o średnicy 1 m i wysokości 50 cm, zbudowane z roślin wodnych, zakłada na ziemi lub wśród gęstych trzcin jezior, bagien i stawów. Gniazdo może się też znajdować na pływającej roślinności. W maju samica składa 3-6 białych jaj, które sama wysiaduje przez 31-38 dni. Młode są gniazdownikami. Pisklęta, zaskoczone w gnieździe przez drapieżnika, próbują go odstraszyć w ten sposób, że kładą się na plecach i wymachują szponami. Błotniaki stawowe wyprowadzają 1 lęg w roku.

### **W Polsce**

W Polsce błotniaki stawowe są ptakami lęgowymi. Można je spotkać również podczas przelotu wiosennego (marzec-kwiecień) oraz jesienno (sierpień-październik).

## **Błotniak stepowy - *Circus macrourus***

Błotniak stepowy, ptak z rodziny jastrzębiowatych (*Accipitridae*), rzędu sokołowych (*Falconiformes*), występuje na stepach, półpustyniach i terenach rolniczych południowo-wschodniej Europy i Azji.

### **Wiadomości ogólne**

Osiąga długość ciała 45 cm, rozpiętość skrzydeł 105 cm i wagę 235-600 g. Odżywia się owadami oraz drobnymi kręgowcami łąkowymi. Gniazda buduje na ziemi, wśród traw. Do Polski regularnie zalatuje zarówno wiosną, jak i jesienią.